

GNM BL21 (DE3) 感受态细胞

| | |
|------------|-----------|
| # CCP01010 | 10×100ul |
| # CCP01020 | 20×100ul |
| # CCP01100 | 100×100ul |

贮存 -80°C

概述： BL21(DE3)菌株适合表达非毒性蛋白。该菌株是以 T7 RNA 聚合酶为表达系统的外源基因蛋白高效表达的宿主。T7 噬菌体 RNA 聚合酶基因的表达受入噬菌体 DE3 区的 lacUV5 启动子调控，该区整合在 BL21 染色体上。BL21 (DE3) 感受态细胞经特殊工艺处理，可用于 DNA 的化学转化。使用 pUC19 质粒检测，转化效率可达 10^7 。

基因型：

F- ompT galDcm lon hsdSB(rB- mB-) λ(DE3 [lacI lacUV5-T7 gene 1 ind1 sam7 nin5])

操作方法

- BL21(DE3)感受态细胞从-80°C拿出，迅速插入冰中，5分钟后待菌块融化，加入目的DNA（质粒或连接产物）并用枪轻轻吹打混匀，冰中静置25分钟。
- 42°C水浴热激90秒，迅速放回冰上并静置5分钟。
- 向离心管中加入500μL不含抗生素的无菌培养基(SOC或LB培养基)，混匀后37°C，200rpm复苏60分钟。
- 3000rpm瞬时离心收菌，留取100μL左右上清轻轻吹打重悬菌块并涂布到含所选质粒筛选抗生素的LB培养基上。
- 待平板正置培养30min后，再将平板倒置放于37°C培养箱过夜培养。

注意事项

- 感受态细胞最好在冰中缓慢融化，不可在冰中放置时间过长，长时间存放会降低转化效率。
- 混入质粒时应轻柔操作。
- 转化高浓度的质粒可相应减少最终用于涂板的菌量。
- 诱导时，IPTG浓度可选(0.1-2mM均可)。
- 为获得需要量的蛋白，最佳诱导时间，温度，IPTG浓度需实验者优化。

本产品仅供科研使用，请勿用于临床诊断及其他用途。